

### **Informacja dla lekarza**

Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Mibrex i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Mibrex.

### **Co należy wiedzieć o leku Mibrex?**

- Lek Mibrex rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Mibrex należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, **nigdy nie należy pomijać dawki.**
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Mibrex bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mibrex należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Mibrex przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

### **Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?**

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Mibrex, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym.

Nie rozpoczynać przyjmowania leku Mibrex bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka

wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,

- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

### **Jak przyjmować lek Mibrex?**

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Mibrex

- 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
- 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
- 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

**KARTA PACJENTA**

**Mibrex®**

10 mg     15 mg     20 mg  
(należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

**KARTĘ NALEŻY  
ZAWSZE PRZECHOWYWAĆ  
PRZY SOBIE**

**Kartę należy pokazywać przed  
leczeniem każdemu  
lekarzowi lub dentyście**

**Jestem poddawany(-a) leczeniu  
przeciwzakrzepowemu  
lekiem Mibrex (rywaroksaban).**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Data urodzenia: \_\_\_\_\_

Masa ciała: \_\_\_\_\_

Inne leki i choroby: \_\_\_\_\_

**W nagłym przypadku należy powiadomić:**

Imię i nazwisko lekarza: \_\_\_\_\_

Telefon lekarza: \_\_\_\_\_

Pieczętka lekarza: \_\_\_\_\_

**Należy również powiadomić:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Pokrewieństwo: \_\_\_\_\_