

KARTA PACJENTA
Rivaroxaban Polpharma
(należy zaznaczyć przepisaną dawkę)
10 mg 15 mg 20 mg

**KARTĘ NALEŻY ZAWSZE
PRZECIHOZYWAĆ PRZY SOBIE**

• Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdym lekarzowi lub dentyście

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Rivaroxaban Polpharma (rywaroksaban).

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Data urodzenia: _____ Masa ciała: _____

Inne leki i choroby: _____

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza: _____

Telefon lekarza: _____

Pieczątko lekarza: _____

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko: _____

Telefon: _____

Pokrewieństwo: _____

Informacja dla lekarza
Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Rivaroxaban Polpharma i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Rivaroxaban Polpharma.

Version 0.1_05.2024_PL_capsules item-place

Miejsce naniesienia kodu QR
zawierające adres
<https://www.bezpiecznaterapiapolpharma.pl/>
oraz numer wewnątrz drukarni

Co należy wiedzieć o leku Rivaroxaban Polpharma?

- Lek Rivaroxaban Polpharma rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Rivaroxaban Polpharma należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy **nie należy pomijać dawki.**
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Rivaroxaban Polpharma bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rivaroxaban Polpharma należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Rivaroxaban Polpharma przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Rivaroxaban Polpharma, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Rivaroxaban Polpharma bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- | | |
|---|---|
| • ból, | • krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle, |
| • obrzęk lub dyskomfort, | • krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca, |
| • ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie, | • odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy. |
| • nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu, | |

Jak przyjmować lek Rivaroxaban Polpharma?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Rivaroxaban Polpharma

- 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia

**15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem**